


# Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir.



Quelques principes simples et essentiels pour limiter la diffusion du virus dans la population :

- **Je me protège et je protège mon entourage** en appliquant les mesures barrières.
- **J'ai un justificatif de prise en charge**, je fais le test rapidement.
- **Je n'ai pas de justificatif de prise en charge**, je consulte immédiatement.
- **Je fais le test dans les 48h** si le médecin me l'a prescrit.
- **Je consulte immédiatement** un médecin en cas de signes du COVID-19, même s'ils sont faibles ou si j'ai un doute.
- **Je m'isole tout de suite** si je suis malade ou si j'ai été en contact à risque avec une personne malade.

## 1 - J'APPLIQUE LES MESURES BARRIÈRES

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Je me <b>lave régulièrement les mains</b>.</li><li>• Je tousse ou j'éternue <b>dans mon coude</b> ou dans un mouchoir.</li><li>• Je me mouche dans <b>un mouchoir à usage unique</b> : je me lave les mains après.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je ne serre pas les mains et j'évite les embrassades.</li><li>• Je reste à une distance <b>d'au moins 2 mètres</b> des autres.</li><li>• Je limite mes contacts à 6 personnes maximum en même temps.</li><li>• J'aère les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je télécharge l'application TousAntiCovid</li><li>• <b>Je porte un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1</b> quand je ne peux pas être à plus de 2 mètres d'une autre personne, dès que je suis en présence d'une personne fragile et dans tous les lieux où cela est obligatoire.</li></ul> |
|--|---|--|

## 2 - JE CONNAIS LES PREMIERS SIGNES DE LA MALADIE POUR LES IDENTIFIER RAPIDEMENT

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Fièvre (ou sensation de fièvre), frissons</li><li>• Toux, mal de gorge, nez qui coule</li><li>• Difficultés à respirer ou une sensation d'oppression dans la poitrine</li><li>• Fatigue intense inexpiquée</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Douleurs musculaires inexpiquées</li><li>• Maux de tête inhabituels</li><li>• Perte de l'odorat</li><li>• Perte du goût des aliments</li><li>• Diarrhée</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pour une personne âgée</b>, l'entourage peut constater une altération brutale de l'état général ou des capacités mentales, de la confusion, des chutes répétées, une aggravation rapide d'une maladie déjà connue.</li></ul> |
|--|---|---|

## 3 - J'AI DES SIGNES DE LA MALADIE, JE CONTACTE MON MÉDECIN

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Si un ou plusieurs signes apparaissent, <b>même faiblement ou si j'ai un doute</b>, j'appelle <b>sans délai</b> mon médecin traitant pour être testé dans les 24 heures.</li><li>• <b>Si je n'ai pas de médecin traitant</b>, j'appelle le 0 800 130 000 (service gratuit + appel gratuit). Dans tous les cas, je peux faire un test dans un lieu de dépistage indiqué sur le site de santé.fr</li></ul> | <p>sans prescription médicale, entièrement pris en charge par l'Assurance Maladie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>En attendant mon rendez-vous avec un médecin et le résultat de mon test</b>, je m'isole immédiatement et je me tiens à distance de toute personne, y compris de mes proches. Dans l'attente du résultat, je peux obtenir un arrêt de travail sur</li></ul> | <p>declare.ameli.fr</p> <p>Je porte un masque si je dois sortir ou si je suis en présence d'autres personnes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Si j'ai des difficultés à respirer, j'appelle immédiatement le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).</b></li></ul> |
|--|---|--|



#### 4 - JE FAIS MON TEST

- Le test est pris en charge sur présentation d'un justificatif.
- En attendant les résultats du test (24 à 48 heures), je reste isolé à mon domicile, je me protège et je protège mes proches.

#### 5 - MON TEST EST POSITIF, VACCINÉ OU NON, JE M'ISOLE À MON DOMICILE JUSQU'À LA GUÉRISON

- Mon isolement doit durer **10 jours après le début des signes**. À la fin de cette période, si je n'ai plus de fièvre, je peux sortir de l'isolement. Mais si, au bout de ces 10 jours, j'ai encore de la fièvre, je dois rester isolé. Une fois que je n'ai plus de fièvre, j'attends 2 jours avant de mettre fin à mon isolement.
- Si l'isolement à domicile n'est pas possible, des solutions d'hébergement peuvent m'être proposées par l'Assurance Maladie.
- Si besoin, un arrêt de travail me sera donné ainsi qu'une fiche avec toutes les explications.
- Grâce à [mesconseilscovid.fr](https://mesconseilscovid.fr) je peux savoir quand mon isolement doit s'arrêter, en fonction de l'évolution de mes symptômes

#### 6 - J'AIDE À IDENTIFIER LES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ EN CONTACT À RISQUE AVEC MOI

- Le médecin m'aide à faire la **liste des personnes** avec lesquelles j'ai eu le plus de contact comme celles qui habitent avec moi. Elles devront aussi être isolées et faire le test.
- Je serai ensuite contacté dans les **24h par l'Assurance Maladie** pour finir d'identifier toutes les autres personnes que j'aurais pu contaminer, au-delà de mon foyer.
- Je saisis dans l'application TousAntiCovid le code fourni par mon médecin ou le laboratoire.

#### QUE FAIRE SI JE SUIS UNE PERSONNE À RISQUE DE FORMES GRAVES DE COVID-19

Je respecte toutes les mesures précédentes mais je suis encore plus vigilant :

- J'évalue ma situation avec mon **médecin** et je lui demande conseil pour prendre les bonnes décisions vis-à-vis de ma santé : déplacements, travail, contacts,...
- Je continue, dans la mesure du possible, à **limiter mes déplacements** et à **éviter les transports en commun** ou à défaut à éviter les heures de pointe.
- Je privilégie les **périodes les moins fréquentées pour faire mes courses**.
- Si possible, je privilégie le **télétravail**.
- Je continue à prendre mes **médicaments** et à me rendre à mes **rendez-vous médicaux**



## LISTE DES PERSONNES À RISQUE DE FORME GRAVE DU COVID-19

- **Les personnes âgées de 65 ans et plus**, en particulier celles de plus de 70 ans
- **Les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires** (hypertension artérielle compliquée ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque).
- **Les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications**
- **Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire** (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, apnées du sommeil, mucoviscidose,...).
- **Les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée**
- **Les malades atteints de cancer évolutif sous traitement** (hors hormonothérapie)
- **Les malades atteints de cirrhose**
- **Les personnes présentant une obésité** (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m<sup>2</sup>).
- **Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise**
- **Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur** ou ayant un antécédent de splénectomie.
- **Les femmes enceintes**, au 3<sup>e</sup> trimestre de la grossesse.

Téléchargez l'application sur l'Apple Store et le Google Play.



**Vous avez des questions sur le coronavirus ?**



[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)



**0 800 130 000**  
(appel gratuit)